

LES ANIMAUX DE GUYANE

Diaporama réalisé par les élèves de

601

COQ DE ROCHE

Adriana Ambouille / Clau-Ann Rubichon
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : Kok roch
- En brésilien : Galo rocha
- En espagnol: gallo de la roca
- En anglais : Rock cock

Statut : il n'est pas protégé car il n'est pas encore signalé en voie de disparition ou en danger critique.

DESCRIPTION

- Classe : oiseau
- Couleur : orange vif
- Taille : 32 cm ou 30 cm
- Poids :140 g



Source :commons.wikimedia.org

MODE DE VIE

Habitat

On peut le trouver dans les zones montagneuses du nord du continent sud-américain. Il fréquente le vieux massif fortement érodé qui s'étend à l'est des Andes et au nord de l'Amazonie. Il est localisé exclusivement dans les affleurements rocheux (grottes).

Alimentation

Il se nourrit principalement de fruits qu'il cueille en vol; et de proies animales (insectes, petits reptiles).

Reproduction

A 48h d'intervalle la femelle pond deux œufs qu'elle couve pendant 27 ou 28 jours. Pendant la période de reproduction le régime semble profiter d'un apport important en proies animales (insectes, petits reptiles) qui délivrent les protéines nécessaires aux jeunes.

IBIS ROUGE

Keilia Cippe / Guyvelande Cippe
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : ibis wouz
- En brésilien : ibis vermelho
- En langue espagnole : ibis rojos
- En anglais : scarlet ibis

Statut : Oui, c'est une espèce protégée car dans les années 1970-1980 les hommes les dépouillaient pour leur plumage, et l'espèce a failli disparaître.

DESCRIPTION

- Classe : oiseau
- Couleur : rouge, un peu bleue pour les jeunes
- Taille : 61cm
- Poids : 772 à 935 grammes



Auteur : Arpingstone

MODE DE VIE

Habitation

Il est présent aux Etats-Unis et au sud du Brésil, en passant par le littoral de l'Océan Pacifique.

Alimentation

Ils se nourrissent de crevettes, de crabes, d'insectes, et de larves aquatiques.

Reproduction

C'est entre mars et juillet qu'ils se reproduisent. Ils pondent entre 2 et 4 œufs.

MODE DE VIE

Habitation

Il est présent aux Etats-Unis et au sud du Brésil, en passant par le littoral de l'Océan Pacifique.

Alimentation

Ils se nourrissent de crevettes, de crabes, d'insectes, et de larves aquatiques.

Reproduction

C'est entre mars et juillet qu'ils se reproduisent. Ils pondent entre 2 et 4 œufs.

CABIAI

Célyana Belvu / Daphnée Merilus
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : kapiaye
- En brésilien : capibara
- En langue wayampi : kapiywa
- En anglais : capyraba

Statut : La chasse est autorisée avec une autorisation préfectorale.

DESCRIPTION

- Classe : C'est un mammifère de la famille des rongeurs.
- Couleur : Il a une grosse tête rectangulaire, un museau carré, des petites oreilles sur le crâne.
- Taille : il mesure entre 50 et 64 cm
- Poids : il pèse entre 35 et 65 kg



MODE DE VIE

Habitat

Il vit en savane et dans les prairies à proximité des rivières.

Alimentation

Il est herbivore : il consomme essentiellement des végétaux aquatiques.

Reproduction

Il se reproduit tous les 6 mois. La femelle peut donner naissance jusqu'à quatre petits qui pèsent chacun 1,5 kg

OCELOT

Cérine Boulbali / Emily Casilla Ramos
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : Chat tig
- En brésilien : Jaguatirica
- En wayana : Malakaja
- En anglais : Ocelot

Statut : Oui, c'est une espèce protégée

DESCRIPTION

- Classe : Mammifère Placentaire
- Couleur : Pelage tacheté, fourrure lisse
Poils courts
- Taille : jusqu'à 1 mètre
- Poids : jusqu'à 16 Kg



Flick.fr

MODE DE VIE

Habitat

L'ocelot vit en forêt et dans la savane, mais il fréquente également les milieux situés à proximité des habitations.

Alimentation

Plutôt nocturne, entièrement carnivore, il se nourrit de petits mammifères, oiseaux et lézards.

Reproduction

**L'âge de la première reproduction se situe entre 1 an $\frac{1}{2}$ et 3 ans $\frac{1}{2}$.
La femelle met bas à 1 ou 2 petits tous les 2 ans seulement.**

LE FOURMILIER

Joseph Besson / Marcel Rozé / Harison Ferreira
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : Lèche main.
- En brésilien : papa-formigas.
- En anglais : anteater



**Statut : ça n'est pas une
espèce protégée**

DESCRIPTION

- Classe : mammifère
- Couleur : il est gris ,noir et blanc avec un très long museau.
- Taille : il mesure environ 1,9 m de longueur et 60cm de haut.
- Poids: il pèse de 18 à 39 kg.



Source : pixabay.com

MODE DE VIE

Habitat

Il est réparti en Amérique du Sud et en Amérique centrale dans les basses savanes humides, le long des berges et dans des forêts humides. Il n'est mais nulle part abondant.

Alimentation

Le fourmilier mange surtout des fourmis, mais il aime aussi les termites et d'autres insectes comme les coccinelles.

Reproduction

Il se reproduit tous les ans ou tous les 2 ans. Après 190 jours de gestation, la femelle met au monde un petit unique qui Pèse de 1 à 2 kilos.

SINGE HURLEUR

Rahia Castale / Maïla Fabien / Marie-Pierre Capoa
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : Baboune
- En brésilien : Guariba
- En anglais : Red howler monkey

Statut : Il est à moitié protégé car on peut le chasser mais on ne peut pas le vendre.

DESCRIPTION

- Classe :Mammifère, famille des primates
- Couleur : Roux / Marron
- Taille :70 cm
- Poids : 6,5kg



Alessandro Catenazzi

MODE DE VIE

Habitat

On le trouve en Amazonie.
Il vit dans les forêts humides
et primaires

Alimentation

Il se nourrit de graines, de
feuilles, de fruits, de petits
reptiles, de petits oiseaux,
et de petits mammifères

Reproduction

La période de gestation est d'environ 140 jours,
La femelle ne met généralement pas qu'un seul petit
Tous les deux ans, en règle générale.

PARESSEUX

Anthony Chocho / Billy Samuel

601


Nom dans les autres langues :

- En créole : Paresseux ou Dos boulé
 - En brésilien : preguiça-comun
 - En anglais : Three toed sloth

**Statut : On peut le chasser mais
on ne peut pas le vendre**

DESCRIPTION

- Classe : mammifère
- Couleur : gris et verdâtre
- Taille: 45 à 55 cm
- Poids: 3 à 6 kg



[flickr.com](https://www.flickr.com)

MODE DE VIE

Habitat

En Amérique tropicale dans les forêts secondaires denses. Il vit généralement dans la canopée

Alimentation

Végétarien : il mange des feuilles d'eucalyptus et de bois canon.

Reproduction

Il ne s'accouple environ que tous les deux ans. La gestation est d'environ 6 mois. Après sa naissance, la maman abandonne le bébé qui la suit jusqu'à l'âge d'un an.

HARPIE FEROCÉ

Emmanuel Boulassy et Sonel Azima
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : Grozèg
- En brésilien : Harpia feroz
- En wayana : piya
- En anglais : Wild harpy

Statut : Cette espèce est protégée

DESCRIPTION

- Classe : oiseau
- Couleur : gris et noire
- Taille : 105 cm du bec à l'extrémité de la queue
, son envergure avoisine 2 mètres
- Poids : 4 000 à 9 000 g



[Commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org)

MODE DE VIE

Habitat

Dans la forêt en Amérique du sud.

Alimentation

Ils mangent des agoutis, des reptiles et des oiseaux.

Reproduction

Ils se reproduisent tous les 3 ans . L'incubation est de 2 œufs pendant 2 mois .
1 seul parvient à voler au bout de 5 mois .

TATOU

Céline Vicioso et Johanna Robo
601

Nom dans les autres langues :

- En créole : tatou
- En brésilien : tatu galinha ou tatu liso
- En wayana : Lahpo
- En anglais : nine banded armadillo

Statut : ce n'est pas une espèce protégée

DESCRIPTION

- Classe : mammifère
- Couleur : gris et beige
- Taille : de 35 à 60 cm ou
de 35 à 57 cm
- Poids : entre 3 et 10 kg
2,7 et 9,8 kg



Auteur : Hans Stieglitz

MODE DE VIE

Habitat

Le tatou vit dans les forêts primaires et secondaires mais aussi les savanes et les milieux bas et broussailleux. La galerie principale de son terrier est tapissée avec un lit de feuilles.

Alimentation

Le tatou se nourrit de fourmis et de termites parfois des fruits des reptiles ou des amphibiens. De nombreux tatou sont insectivores, mais quelques-uns sont omnivores.

Reproduction

La femelle met bas 4 petits par portée. Le petit pèse entre 50 et 130 gr. Il est sevré à 4 ou 5 mois. Quand la femelle est fécondée, L'ovule fertilisée reste jusqu'à 7 mois dans l'utérus avant de Commencer son développement.